

La durée moyenne de gestation d'une CG36 est de 114 jours.
Veiller à une ambiance calme.

> Propositions

- Entrer tôt les truies dans les salles de maternité afin qu'elles s'habituent à leur nouvel environnement (minimum 5 jours avant la mise bas)
- Intercaler les cochettes avec les truies plus vieilles. Éviter de placer les cochettes près des sources de stress (porte, coin, ventilation ...)
- Préférer un aliment péri-partum, sinon utiliser soit un aliment gestante jusqu'à 3 jours après mise-bas ou directement un aliment allaitante dès l'entrée en maternité
 - L'aliment allaitante est déconseillé en cas de constipation
- Attention à respecter la balance électrolytique des aliments pour le bon déroulement des mises-bas



LES MISES BAS

Pendant les mises bas, les truies CG36 sont très participatives. Elles sont calmes et maternelles, ce qui facilite le travail de l'éleveur. Les porcelets sont vigoureux et atteignent rapidement la mamelle pour une meilleure transmission de l'immunité maternelle.

> Propositions

DÉROULEMENT DES MISES BAS

- Limiter les interventions : laisser faire la truie, maintenir une surveillance discrète et calme
- Peu ou très peu de fouille (< 5%)
- Durée de mise bas : jusqu'à 4h entre le 1er porcelet et le placenta
- Cochettes : si possible ne pas utiliser de prostaglandines
- Truies : réserver l'usage des prostaglandines le jeudi pour les dernières mises bas du vendredi
- Limiter les adoptions pendant les 6 heures qui suivent la mise bas
- Mettre le maximum de porcelets sous les truies en maximisant les portées de rang 2 à 5
- Limiter les soins pendant les premières 48 heures



Porcelets une heure après la mise bas

LA PRISE COLOSTRALE

La consommation, le plus tôt possible après la naissance, du colostrum de la mère en quantité suffisante, est un facteur essentiel de l'immunité du porcelet.

Réaliser si nécessaire une tétée « contrôlée »